

Dépistage des maladies héréditaires chez les Spaniels

Les chiens doivent être âgés de 12 mois révolus au moment du dépistage. Les tests génétiques (APR / NF / FUC), peuvent être effectués plus tôt (Art. 9.1)

American Cocker Spaniel						
DH (Art. 9.2)	PL (Art. 9.4)	APR* (Art. 9.5. / 9.6)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	
American Water Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)		
Clumber Spaniel						
DH (Art. 9.2)	DC (Art. 9.3)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	
English Cocker Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5 / 9.6)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	NF (Art.9.8)	
English Springer Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5 / 9.6)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	Goniodysplasie** (Art.9.7)	FUC (Art.9.8)
Field Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)		
Irish Water Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)		
Sussex Spaniel						
DH (Art. 9.2)	DC (Art. 9.3)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	
Welsh Springer Spaniel						
DH (Art. 9.2)	APR* (Art. 9.5)	Cataracte* (Art. 9.5)	Entropion* (Art.9.5)	Ectropion* (Art. 9.5)	Goniodysplasie** (Art.9.7)	

* Lors d'une utilisation pour l'élevage, l'attestation ophtalmologique ne doit pas être antérieure à une année (365 jours)

** L'examen doit être répété tous les 3 ans pour les chiens admis à l'élevage.